

<ヒトパピローマウイルス感染症>

ワクチン種類	接種回数	スケジュール
サーバリックス (2価)	3回	<p>1か月後 (1か月以上の間隔で2回)</p> <p>1回目から6か月後 (1回目から5か月以上、かつ2回目から2か月半以上)</p>
ガーダシル (4価)	3回	<p>2か月後 (※4 少なくとも1か月以上)</p> <p>1回目から6か月後 (※4 2回目から少なくとも3か月以上)</p>
シルガード (9価) ※R5.4月～	2回	<p>1回目を15歳になる前に受ける場合</p> <p>1回目から6か月後</p>
	3回	<p>1回目を15歳になってから受ける場合</p> <p>2か月後 (※4 少なくとも1か月以上)</p> <p>1回目から6か月後 (※4 2回目から少なくとも3か月以上)</p>

※4 やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合

<ヒトパピローマウイルス感染症(9価/シルガード)>

15歳未満	①15歳までに接種する場合	<p>6か月以上あけて1回接種 (最低、5か月以上)</p>
	②1回目は15歳までに接種したが、2回目が15歳を超えてしまう場合	<p>6か月以上あけて1回接種 (最低、5か月以上)</p>
	③1回目と2回目の接種間隔が5か月未満の場合	<p>5か月未満で2回目接種</p> <p>2回目から最低3か月以上あけて1回接種</p>
15歳以上	①15歳になってから接種する場合	<p>2か月以上あけて接種 (※1か月以上)</p> <p>1回目から6か月以上あけて接種 (※2回目から3か月以上)</p>